

GastroPanel

Tutkimuksen tarkoitus

GastroPanel-tutkimuksella voidaan todeta helikobakteeri-infektio, atrofinen gastriitti ja arvioida niihin liittyviä riskejä. Yhdestä verinäytteestä voidaan määrittää mahalaukun limakalvoon liittyviä sairauksia ja niihin liittyviä riskejä.

Tutkimukseen valmistautuminen

Ennen tutkimusta teidän olisi huomioitava seuraavat asiat:

- Ennen tutkimusta tulisi olla 4 - 10 tuntia syömättä, juomatta ja tupakoimatta.
- Tutkimus ei edellytä säännöllisen lääkityksen lopettamista, lukuun ottamatta seuraavia lääkkeitä, jotka vaikuttavat mahanesteiden eritykseen:
 - **Viikko ennen tutkimusta:** lääketeineet, jotka estävät suolahapon erityksen. Ranitidiini (Esofex, Inside Brus, Ranicur, Ranil, Ranimex, Ranitidin, Ranitidine, Ranixal, Zantac), famotidiini (Famotidin, Pepcid, Pepcidin, Pepcid Duo), nitsadiini (Nizax), lansopratsoli (Lansoprazol, Lansoprazole, Lanzo, Zolt), omepratsoli (Losec, Omeprazol) ja muut protonipumpun estäjät (Nexium, Pariet, Somac).
 - **Päivä ennen tutkimusta:** lääketeineet, jotka neutraloivat mahanesteitä. Antasidit (Balanci Novum, Gaviscon, Link, Magnesiummaito, Novaluzid, Rennie) ja limakalvon suoja-aineet (Alsucral, Antepsin).
- Käytössä olevan lääkityksen turvallisesta keskeytyksestä tulisi neuvotella lääkärin kanssa. Mikäli lääkitystä ei voida keskeyttää. Teidän tulisi ilmoittaa näytteenottajalle käyttämänne lääkkeet.

Tutkimuksen suoritus

Näytteeksi otetaan paastoverinäyte kyynärtaipeen laskimosta.

