

Histamiinialtistuskoe

Histamiinikokeella selvitetään keuhkoputkien supistumisherkkyyttä.

Miten tutkimus tehdään?

Tutkimuksen aluksi mitataan keuhkojen toiminta puhalluskokeella. Tämän jälkeen tutkittava hengittää muutaman minuutin välein histamiinia sisältävää sumutetta. Keuhkojen toiminta mitataan puhalluskokeella jokaisen histamiiniannoksen jälkeen. Tutkimuksen lopussa tutkittavalle annetaan hengitettävää keuhkoputkia laajentavaa lääkettä. Kokonaisuudessaan tutkimus kestää noin tunnin.

Ennen tutkimusta

Hengitystieinfektio on este tutkimukselle. Tutkimus voidaan tehdä vasta kaksi viikkoa infektion paranemisen jälkeen. Ennen tutkimusta tutkittavan tulee olla: 24 tuntia ilman alkoholia, 4 tuntia tupakoimatta, 2 tuntia ilman kahvia, teetä, kolajuomia, energiajuomia ja raskasta aterialla. Lisäksi tutkimuspäivänä tulee välttää rasittavaa liikuntaa.

Keuhkolääkitys (hoitohenkilökunta valitsee oikean vaihtoehdon)

- Voitte ottaa keuhkolääkkeenne normaalisti
- Teidän tulee tauottaa keuhkolääkkeenne seuraavasti

12 tuntia ennen koetta:

Airomir, Bricanyl, Buventol, Ventoline.

24 tuntia ennen koetta:

Atrovent, Atrovent Comp, Atrodual, Ipramol.

Kaksi vuorokautta ennen koetta:

Foradil, Formoterol, Oxis, Serevent, Lomudal, Tilade.

Kolme vuorokautta ennen koetta:

Aminocont, Nuelin depot, Retafyllin, Theofol, Theofol comp, Accolate, Montelukast, Singulair ja yskänlääkkeet.

Neljä vuorokautta ennen koetta:

Spiriva.

Viisi vuorokautta ennen koetta:

Kaikki antihistamiinit (esim. Aeries, Cetirizin, Heinix, Kestine, Histec, Xyzal, Zyrtec)

Neljä viikkoa ennen koetta:

Aerobec, Alvesco, Beclomet, Budesonid, Flixotide, Pulmicort, Seretide, Symbicort

Poikkeustapauksissa tutkimus voidaan tehdä lyhyempien lääketaukojen jälkeen. Mikäli Teidän kohdallanne on näin, informoi hoitohenkilökunta asiasta.

Mikäli teillä on kysyttävää tutkimuksesta, voitte soittaa
puh: _____

Lisätietoja:
